

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil implemetasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan posisi orthopnea pada pasien TB paru untuk penurunan sesak napas kepada Tn. J dengan keluhan sesak napas dan batuk berdahak serta dapat dijadikan intervensi keperawatan dalam menurunkan. Tindakan tersebut dapat memperbaiki bersihan jalan napas dan intoleransi aktivitas melakukan terapi oksigen sehingga dapat menurunkan sesak pada pasien yang diakibatkan oleh penyakit TB paru.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwa hal ini akan terus dimasukkan sebagai umpan balik untuk pengembangan topik.

2. Bagi Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan upaya dalam mencega terjadinya TB Paru.

3. Bagi Pasien dan Keluarga

Diharapkan keluarga dan pasien dapat menangani masalah yang dialami oleh pasien dengan memberikan posisi orthopnea dan batuk efektif secara mandiri dirumah ketika mengalami kekambuhan untuk menurunkan sesak napas.