

ABSTRAK

PENERAPAN IODOSORB POWDER PADA PERAWATAN LUKA PASIEEN POST SECTIO CAESARAE DI KLINIK GRIYA AFIAT MAKASSAR

(Wahyuni Ningsi)¹, (Nur Wahyuni Munir, Wa Ode Sri Asnaniar)²

¹Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Muslim Indonesia

²Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Muslim Indonesia

Latar Belakang : Sebagian besar ibu yang menjalani persalinan melalui operasi caesar biasanya dapat keluar dari rumah sakit dalam waktu tiga hingga lima hari pascaoperasi. Namun, proses pemulihan total memerlukan perawatan mandiri yang teratur di rumah serta pemantauan berkala oleh dokter kandungan selama kurang lebih satu bulan. Apabila luka tidak dirawat secara optimal, dapat terjadi gangguan pada penyembuhan luka operasi. Berbagai metode perawatan luka telah banyak dibahas, salah satunya adalah penggunaan iodosorb powder.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perubahan dalam penerapan iodosorb powder pada perawatan luka pasien post-sectio caesarea di Klinik Griya Afiat Gowa kota Makassar.

Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif case report yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan, instrumen yang digunakan dalam menilai luka post SC yaitu dengan metode TIME (Tissue Management Inflammation Control Moisture Blance Epitheel Edge).

Hasil : Setelah tindakan perawatan luka pada hari pertama, didapatkan masih terdapat luka biofilm pada luka dengan hasil Granulasi (80%), Epitel (20%), dengan panjang luka 2,9, lebar 0,4 kedalaman 0,3, nyeri berkurang. Evaluasi setelah tindakan di hari kedua dengan hasil masih tampak adanya perkembangan biakan biofilm pada bagian dalam luka namun sudah berkurang dengan hasil, Granulasi (60%), Epitel (40%) panjang luka 2,5, lebar 0,2 kedalaman 0,2 dan sudah tidak ada nyeri.

Kesimpulan : Dengan ini bisa penulis simpulkan bahwa ada pengaruh yang baik terhadap penggunaan iodosorb powder pada perawatan luka Post Section Caesarae yang ditandai dengan penurunan ukuran luka dan penurunan granulasi sebanyak 20% pada luka.

Kata Kunci: Luka Post-Sectio Caesarea, Iodosorb Powder, Penyembuhan Luka, Perawatan Luka Operasi

ABSTRACT

APPLICATION OF IODOSORB POWDER IN WOUND CARE OF POST SECTIO CAESARAE PATIENTS AT GRIYA AFIAT MAKASSAR CLINIC

(Wahyuni Ningsi)¹, (Nur Wahyuni Munir, Wa Ode Sri Asnaniar)²

¹Nursing Science Study Program, Faculty of Public Health, Muslim
University of Indonesia

²Nursing Profession Study Program, Faculty of Public Health, Muslim
University of Indonesia

Background: Most mothers who undergo cesarean delivery can usually be discharged from the hospital within three to five days after surgery. However, full recovery requires regular self-care at home and regular monitoring by an obstetrician for approximately one month. If the wound is not cared for optimally, it can interfere with surgical wound healing. Various wound care methods have been widely discussed, one of which is the use of iodosorb powder.

Purpose: This study aimed to determine changes in the application of iodosorb powder in wound care for post-cesarean section patients at the Griya Afiat Clinic in Gowa, Makassar.

Method: This study used a descriptive case report design, conducted in three sessions. The instrument used to assess post-cesarean section wounds was the TIME (Tissue Management, Inflammation Control, Moisture, and Blance Epithelial Edge) method.

Results: After wound care on the first day, there were still biofilm wounds on the wound with Granulation results (80%), Epithelium (20%), while the pain had decreased, Evaluation after the procedure on the second day with the results that there was still visible biofilm proliferation on the inside of the wound but it had decreased with the results, Granulation (60%), Epithelium (40%) and pain was gone.

Conclusion: With this, the author can conclude that there is a good influence on the use of Iodosorb powder in post-SC wound care.

Keywords: Post-Caesarean Wounds, Iodosorb Powder, Wound Healing, Surgical Wound Care.